

Detenga una sobredosis con Narcan®

Siga estos pasos para detener una sobredosis:

1 Llame al 911

Diga: “una persona no respira” o “creo que es una sobredosis”. Quédese hasta que llegue la ayuda, aún si la persona parece estar mejor.

2 Administre Narcan®

Empuje el atomizador hasta que la punta esté dentro de la nariz. Vaya al paso 4. Si no obtiene respuesta en 3 minutos, administre otra dosis.

3 Haga respiraciones o RCP

Asegúrese de que la boca esté despejada. Incline la cabeza hacia atrás, con el mentón hacia arriba, y presione la nariz. Administre una respiración cada 5 segundos y asegúrese de que el pecho se eleve con cada una. Intente hacer RCP si está capacitado.

4 Quédese hasta que llegue ayuda

Si la persona respira bien, recuéstela de costado. Si no respira bien, repita los pasos 3 y 4. Quédese hasta que llegue ayuda.

Respiración boca a boca


ASEGÚRESE DE QUE EL PECHO SE ELEVE CON CADA RESPIRACIÓN.



Posición de recuperación



LA CABEZA APOYADA EN LAS MANOS
LA RODILLA EVITA QUE EL CUERPO RUEDE SOBRE EL ESTÓMAGO



La Ley del Buen Samaritano protege a las personas que sufren una sobredosis o que buscan ayuda para alguien con sobredosis de ser acusados o procesados por posesión simple de drogas.

HelplineMA.org
1-800-327-5050

mass.gov/narcan

Departamento de
Salud Pública de
Massachusetts



SA5847