

DETENGA UNA SOBREDOSIS

SIGA ESTOS PASOS:

1 VERIFIQUE SI SE TRATA DE UNA SOBREDOSIS

Signos de sobredosis:


- No respira bien
- Piel azulada o gris
- No reacciona cuando usted frota sus nudillos en el pecho



SA5819


2 LLAME AL 911

- Llame al 911
- Diga “una persona no puede respirar” o “creo que es una sobredosis”
- Quédese hasta que llegue ayuda, incluso si la persona parece estar mejor*



3 ADMINISTRE NARCAN®

- Empuje el atomizador hasta que la punta esté dentro de la nariz
- Siga el paso 4
- Si no obtiene respuesta en 3 minutos, administre otra dosis



4 DAR RESPIRACIÓN BOCA A BOCA O RCP

- Asegúrese de que no haya nada en la boca
- Incline la cabeza hacia atrás, con el mentón hacia arriba, y presione la nariz
- Dé una respiración cada 5 segundos
- Intente hacer RCP si está capacitado



ASEGÚRESE DE QUE EL PECHO SE ELEVA CON CADA RESPIRACIÓN

5 QUÉDESE HASTA QUE LLEGUE AYUDA

- Si la persona respira bien, acuéstela de lado
- Si no respira bien, repita los pasos 3 y 4
- Quédese hasta que llegue ayuda*



CABEZA APOYADA EN LAS MANOS

LA RODILLA EVITA QUE EL CUERPO GIRE Y QUEDE BOCA ABAJO



HelplineMA.org

800-327-5050

mass.gov/narcan

*La Ley del Buen Samaritano (Good Sam Law) evita que se acuse o procese por tenencia simple de drogas a las personas que tuvieron una sobredosis o que buscan ayuda para alguien que tuvo una sobredosis.